28 DE ANI
National
Cotidian fondat în 1997

Scris de **Claudia Marcu** 2025-10-28

Vaccinul care ucide. Un studiu făcut ca la carte dărâmă mitul imunizării împotriva pneumoniei

Un studiu realizat de cercetătorii din Spania, în care au fost implicați peste 2 milioane de pacienți, monitorizați pe o perioadă de un an, a scos la iveală un adevăr crunt. Vaccinul împotriva pneumoniei nu funcționează și, mai mult, că rata mortalității a fost mai mare în rândul persoanelor vaccinate, față de cele nevaccinate. Astfel, cercetătorii au concluzionat că vaccinarea pneumococică nu s-a dovedit eficientă în prevenirea pneumoniei pneumococice spitalizate, a pneumoniei din orice cauză sau a decesului cauzat de aceste boli în cohorta generală de studiu.

Concluziile studiului publicat luna aceasta de cercetătorii spanioli pe bmcinfectdis.biomedcentral.com, privind eficacitatea vaccinării antipneumococice împotriva pneumoniei la adulți în lumea reală, au fost extrem de alarmante. Vaccinul nu funcționează deloc așa cum s-a spus, ci, dimpotrivă, provoacă rate mai mari de mortalitate și de îmbolnăviri. Studiul a investigat eficacitatea clinică a vaccinului pneumococic conjugat 13-valent (PCV13) și a vaccinului polizaharidic pneumococic 23-valent (PPsV23) împotriva pneumoniei pneumococice (PP) și/sau a pneumoniei din orice cauză (PCA) spitalizate la adulții de vârstă mijlocie și vârstnici înainte de începerea pandemiei de Covid 19.

Mai exact, acesta s-a desfășurat pe tot parcursul anului 2019, perioadă în care au fost urmărite 2.234.003 persoane cu vârsta ≥ 50 de ani din Catalonia, Spania. Rezultatele au arătat că administrarea vaccinurilor a fost asociată cu un risc mai mare de cazuri spitalizate de pneumonie pneumococică, dar și de pneumonie din orice cauză.

Mai mult, la persoanele în vârstă (≥ 65 de ani) și la persoanele cu risc (imunocompromise, boli respiratorii/cardiace cronice), vaccinurile PCV13 și PPsV23 nu s-au dovedit a fi eficiente, nici în prevenirea spitalizării, nici în prevenirea deceselor. Deși vaccinurile au fost recomandate pentru adulți – în special la cei cu risc crescut – încă din anii 2010, s-a dovedit că eficacitatea și impactul vaccinării asupra prevenirii pneumoniei în rândul acestora au fost incerte.

Cifre șocante

Pe parcursul perioadei de studiu, au fost observate 2.319 cazuri de pneumonie pneumococică (PP) spitalizate -110 la pacienții vaccinați cu PCV13, 1.558 la pacienții vaccinați cu PPsV23- și 12.848 cazuri de ACP (pneumonie din toate cauzele) -542 la pacienții vaccinați cu PCV13, 9.097 la pacienții vaccinați cu PPsV23. La nivel global, ratele de mortalitate observate (RCF) au fost de 7,2% (166/2.319) pentru PP și de 9,4% (1.204/12.848) pentru ACP.

În funcție de statusul vaccinal, RCF-urile pentru PP au fost de 5,5% (6/110) la persoanele vaccinate cu PCV13 față de 7,2% (160/2.209) la persoanele nevaccinate cu PCV13 ($p = 0,478$) și de 7,9% (123/1.558) la persoanele vaccinate cu PPsV23 față de 5,7% (43/761) la persoanele nevaccinate cu PPsV23 ($p < 0,001$). Ratele de mortalitate (RCF) pentru ACP au fost de 10,7% (58/542) în rândul persoanelor vaccinate cu PCV13 față de 9,3% (1.146/12.306) în rândul persoanelor nevaccinate cu PCV13 ($p = 0,278$), fiind de 9,7% (882/9.097) în rândul persoanelor vaccinate cu PPsV23 față de 8,6% (322/3.751) în rândul persoanelor nevaccinate cu PPsV23 ($p = 0,050$), se arată în studiu. ”În analizele neajustate, ambele vaccinuri (în special PCV13) au fost asociate cu un risc mai mare pentru toate evenimentele analizate, reflectând excesul de risc inițial în rândul subiecților vaccinați”, semnalează cercetătorii spanioli.

Risc crescut de pneumonie

Ca principală constatare în acest studiu de date din lumea reală, vaccinarea pneumococică nu s-a dovedit eficientă (nici PPsV23, nici PCV13) în prevenirea pneumoniei pneumococice (PP) spitalizate, a pneumoniei din orice cauză (PCA) sau a decesului cauzat de PP/PCA în cohorta generală de studiu. Analizele stratificate axate pe persoanele în vârstă, subiecții imunocompromiși și subgrupurile populaționale cu risc nu au relevat efecte protectoare ale vaccinării nici la nivel populațional. În acest studiu, ratele de incidență ale PP/PCA au fost mult mai mari în rândul persoanelor vaccinate decât în rândul persoanelor nevaccinate, reflectând excesul de risc inițial al subiecților vaccinați care erau mai în vârstă și aveau mai multe comorbidități decât persoanele nevaccinate (în special în rândul vaccinate cu PCV13).